

Nr.1 din . 17. 02. 2014

„ A preveni este mai simplu decât a vindeca”.

BULETIN DE AVERTIZARE

In perioada repaosului vegetative, cînd condițiile meteorologice sunt prielnice(temperaturi peste 5°C) se recomanda executarea tratamentelor la culturile de pomi fructiferi, arbuști, pepiniere pomicole si dendrologice, pentru reducerea rezervei biologice de ciuperci si bacterii fitopatogene (focul bacterian al rozaceelor, monilioze, rapan,fainare)cat si a rezervei biologice de insecte daunatoare(paduchele de San-Jose,paduchi țestoși,ouă, de afide, acarieni,cotari,psilide) folosind urmatoarele produse:

PENTRU REZERVA BIOLOGICA DE BOLI : unul din produsele PPP

-- CUPROXAT FLOWABLE-0,35%(s.a.Cu 190g/l)

- KOCIDE 2000-0.25%(s.a.Cu din hidroxid de cupru-53,80%)
- FUNGURAN OH 50 WP-0,2-0,3%(s.a.Cu din hidroxid de cupru)
- SUPER CHAMP 250 SC -0,2% (s.a.Cu din hidroxid de cupru)

Iar pentru combaterea fainarii produsele

- KUMULUS DF -0,2-0,3% sau SULFUR 80 WG-0,3%

PENTRU REZERVA BIOLOGICA DE DAUNATORI : unul din produsele PPP

- MOSPILAN 20 SG -0,450 Kg/ha(s.a.-acetamiprid- 20%)
+ 0,5% TOIL sau

- CONFIDOR OIL SG 004-1,5%(s.a.-imidacloprid-4g/l)
sau NUPRID OIL 004 CE-1,5%(s.a.-imidacloprid- 4g/l)
sau NUPRID OIL -1,5% sau

- JUVINAL 10 EC -0,1% (piriproxifen 100g/l)-doar larve hibernante
de San –Jose

RECOMANDARI:

Tratamentele se vor executa numai in perioada repaosului vegetativ pina la pornirea in vegetatie, prin imbaierea pomilor cu solutie, in zilele insorite, fara vant ,cu temperaturi peste5°C, cu tendinta de crestere. Pentru pomii izolati, se va utilize 3-5 l soluție/pom in functie de marimea coroanei.La prepararea solutiei se va respecta concentratiile sau dozele de pesticide recomandate, evitandu-se supra sau subdozarea.

Se va respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar,pe cele de securitatea muncii,securitate a incendiilor,DE PROTECTIE A ALBINELOR,animalelor, pestilor si altor animale acvatice.

INTOCMIT,
Consilier Călțun Florin