

„A preveni este mai simplu decât a vindeca”

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**PRUN**

TRATAMENTUL I. Agentul patogen. Monilioză (*Monilinia laxa*) în special, cât și *Monilinia fructigena*, Ciuruirea frunzelor de prun (*Coryneum beijerinckii*), Pătarea și ciuruirea bacteriană a sămburoaselor (*Xanthomonas pruni*, *Pseudomonas mors prunorum*), Rapăn prun (*Venturia c.* sinonim *Fusicladium pruni*).

Perioada optimă de tratament: „Buton alb”.

Prin acest tratament se combat și se diminuează formele de rezistență peste iarnă a bolilor de mai jos (micelii de rezistență, ascospori, conidii de iarnă) pentru a reduce infecția primară.

Fungicide folosite:

- CUPROXAT FLOWABLE-0,35% sau
- BOUILLIE BORDELAISE WDG-0,5% sau
- ALCUPRAL 50 PU-0,2% sau + fungicidele cuprice combat micozele și bacteriozele
- FOLPAN 80 WDG-0,2% sau
- ODEON 720 SC-0,15% sau
- DELAN 700 WDG-0,035-0,05% sau

TRATAMENTUL II. La scuturarea petalelor (când 10-15% din petale sau scuturat).

Viespile prunelor: *Hoplocampa minuta* (Viespea neagră) și *Hoplocampa flava* (Viespea galbenă), forme rezistente peste iarnă, acarieni, insecte defoliatoare, afide.

Monilioza (*Monilia laxa* și *fructigena*), Deformarea fructelor (*Taphrina deformans*), Ciuruirea micotică (*Ascospora beijerinckii*), Pătarea roșie a frunzelor de prun (*Polystigma rubrum*).

Schemă orientativă de tratament:

<u>FUNGICIDE</u>	<u>INSECTICIDE</u>	<u>ACARICIDE SI INSECTOACARICIDE folosite pentru combaterea acarienilor</u>
- BRAVO 500 SC-0,15% sau	FASTAC 10 EC-0,02% sau	
- FOLPAN 80 WDG-0,2% sau	IMIDAN 50 WP-0,05% sau	
- DELAN 700 WDG-0,035-0,05% sau	KARATE ZEON-0,015% sau	NISSORUN 10 WP-0,03%
- VONDOZEB 75 DG-0,20% sau	LASER 240 SC-0,06%	
- ODEON 720 SC-0,15% .		

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru PROTECȚIA FAMILIILOR DE ALBINE împotriva intoxicațiilor cu pesticide, veți lua și respecta obligatoriu toate măsurile ce vă revin în acest sens, mai ales în perioada de „înflorire”. Se vor respecta de asemenea măsurile ce privesc și protecția altor agenți polenizatori, a entomofaunei utile, animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

INTOCMIT,  
ING. SPINU VIOREL