

BULETIN DE AVERTIZARE
PRUN

Conditiiile din ultima perioada au favorizat aparitia urmatoarelor boli si daunatori:
VIESPEA PRUNELOR(*Hoplocampa minuta Christ.si Hoplocampa flava L*),VIESPEA SEMINTELOR DE PRUN(*Eurytoma schreineri Schr.*),ACARIENI,INSECTE DEFOLIATOARE, AFIDE si boli ca:MONILIOZA(*Monilinia laxa si fructigena*),DEFORMAREA FRUCTELOR, CIURUIREA MICOTICA SI BACTERIANA A FRUNZELOR,PATAREA ROSIE A FRUNZELOR DE PRUN(*Polystigma rubrum Pers.*)
Perioada optima de tratament-**cand 10-15% din flori si-au scuturat petalele.**

SCHEMA ORIENTATIVA DE TRATAMENT:

FUNGICIDE

-SIGNUM- 0,05%(s.a.boscalid 26,7%+piroclostrobin 6,7%)-poate fi aplicat fie in perioada infloritului(pentru combaterea moniliozei florilor),fie in perioada maturarii fructelor(pentru combaterea moniliozei fructelor)sau
-BRAVO 500 SC -0,15%sau
-FOLPAN 80 WDG-0,2%sau
-VONDOZEB-0,2%

+

INSECTICIDE

-FASTER 10 CE-0,025%sau
-DECIS MEGA EW-0,025%sau +
-LASER 240 SC-0,06% sau
-KARATE ZEON-0,015%

ACARICIDE

-NISSORUN 10 WP -0,03%sau
-ORTUS 5 SC-0,1%sau
-APOLLO 50 SC -0,04%

Urmatorul tratament se aplica la **8-12 zile** pentru combaterea acelorasi boli si daunatori dar in special pentru VIESPEA SEMINTELOR DE PRUN(*Eurytoma schreineri Schr*) Al .doilea tratament pentru combaterea VIESPEI SEMINTELOR DE PRUN se repeta la **10-12 zile**
Cantitatea de solutie la hectar 1000-1500 litri.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim,la prepararea solutiei se vor respecta dozele sau concentratiile recomandate,la realizarea amestecurilor se va verifica compatibilitatea pesticidelor(fizica si chimica),se va respecta principiul ALTERNANTEI.
Se va respecta normele de lucru cu produse de uz fitosanitar,pe cele de protecti muncii,de PROTECTIE A ALBINELOR (conf, Ord. Interministerial nr127/1991),animalelor,pestilor si altor vietuitoare acvatice.

Intocmit,
Consilier Caltun Florin