

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**CIRES+VISIN**

Conditiiile climatice din ultima perioada, favorizeaza aparitia si dezvoltarea unor boli specifice ciresului si visinului: Monilioze (Monilinia laxa in special, dar si Monilinia fructigena), Antracnoza (Brumeriella jaapii), Ciuruirea frunzelor (Ascospora beijerincki), Afide, Omizi defoliatoare, Acarieni. Perioada optima de tratament - **scuturarea petalelor**

Se vor folosi urmatoarele **fungicide**:

- CHORUS 75 WG-0,02% sau
- CUPROXAT FLOWABLE-0,35% sau
- SIGNUM-0,05% sau
- DITHANE M 45-0,2% sau
- FOLICUR SOLO 250 EW-0,075%-0,1% sau
- ORIUS 25 EW-0,075%-0,1%

Se vor folosi urmatoarele **insecticide**

- KARATE ZEON-0,015% sau
- DECIS 2,5 EC-0,025% sau
- FASTAC 10 EC-0,02% sau
- DECIS MEGA 50 EW-0,015%

+

Pentru combaterea Acarienilor se vor folosi urmatoarele acaricide:

- APOLLO 50 SC-0,04% sau
- NISSORUN 10 WP-0,03%

Urmatorul tratament se executa la 10-12 zile. Cantitatea de solutie la hectar-1000-1500 litri.

**ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:**

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, la prepararea solutiei se vor respecta dozele sau concentratiile recomandate, la realizarea amestecurilor se va verifica compatibilitatea pesticidelor (fizica si chimica), se va respecta principiul ALTERNANTEI. Se vor respecta normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de protectia muncii, de PROTECTIE A ALBINELOR (conf. Ord. Interministerial nr.127/1991) animalelor, pestilor si altor vietuitoare acvatice.

Intocmit,  
Consilier Caltun Florin

