

BULETIN DE AVERTIZARE
CAIS+ PIERSIC

Conditiiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea urmatoarelor boli si daunatori:MONILIOZA, FAINARE,CANCERUL RAMURILOR,CIURUIREA MICOTICA SI BACTERIANA,MOLII,AFIDE,OMIZI DEFOLIATOARE.

Redam mai jos o schema orientativa de tratament:

FUNGICIDE:

- DITHANE M 45-0,2%(s.a.mancozeb 80%)-basicare+ciuruire+monilioza sau
- CUPROXAT FLOWABLE –O,35%(s.a.190g/l Cu.)- monilioze sau
- SCORE 250 EC -0,015-0,02%(s.a.250 g/l difeconazol)-basicare,ciuruire+monilioza+fainare sau
- CHORUS 75 WG-0,02%(s.a. ciprodinil-75%)-monilioza

+

INSECTICIDE:

- KARATE ZEON-0,015%(s.a. lambda-cihalotrin 50g/l)-sau
- DECIS MEGA 50 EW-0,015%(s.a. deltametrin 50g/l) sau
- CYPERGUARD 25 EC-0,02%(s.a. cipermetrin 25%) sau
- IMIDAN 50 WP -0,1%(s.a.fosmet 50%)

Tratamentul se repeta la 10-12 zile.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, iar la prepararea solutiei se vor respecta:

- dozele sau concentratiile recomandate
- compatibilitatea produselor de protectia plantelor utilizate
- folosirea produselor de protectia plantelor din grupe chimice diferite

La efectuarea tratamentelor fitosanitare cu p.p.p.,se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii,de PROTECTIE A ALBINELOR(conf. Ord. Interministerial nr.127/1991),animalelor,pestilor si altor vietuitoare acvatice.

Intocmit,
Consilier superior Caltun Florin