

M.A.D.R.  
D.A.J. VRANCEA  
UNITATEA FITOSANITARA  
Nr.24 din 06.05.2014

*„ A preveni este mai simplu decat a combate”*

## BULETIN DE AVERTIZARE CAIS+ PIERSIC

Conditiiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea urmatoarelor boli si daunatori: MONILIOZA,BASICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC ,FAINAREA, CANCERUL RAMURILOR,CIURUIREA MICOTICA SI BACTERIANA,MOLIA ORIENTALA A FRUCTELOR,MOLIA VARGATA,AFIDE ,OMIZI DEFOLIATOARE.

Perioada optima de tratament-**fructul cu diametrul de peste 2,5 cm.**

Redam mai jos o schema orientativa de tratament:

### FUNGICIDE

- DITHANE M-45-0,2%-basicare+ciuruire+monilioza, sau
- TOPSIN 500 SC-0,14%-basicare+fainare,sau
- BRAVO 500 SC-0,15%-basicare+monilioze,sau
- FOLICUR SOLO 250 EW-0,075-0,1%-monilioze,sau
- CHORUS 75 WG-0,02%-monilioze

+

### INSECTICIDE

- DECIS MEGA 50 EW-0,015%(s.a.-deltametrin 50g/l) sau
- CYPERGUARD 25 EC-0,02%(s.a.-cipermetrin-25%) sau
- KARATE ZEON-0,015%(s.a.-lambda-cihalotrin-50g/l) sau
- IMIDAN 50 WP-0,1%(s.a.-fosmet 50%)

Tratamentul fitosanitar **se repeta la 10-12 zile**.Cantitatea de solutie la hectar:1000-1500 litri.

### ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim,iar la prepararea solutiei se vor respecta:

- dozele sau concentratiile recomandate,
- compatibilitatea produselor de protectia plantelor,
- folosirea de produse de protectia plantelor din grupe chimice diferite.

La efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor,se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii,de PROTECTIA A ALBINELOR(conf.Ord. Interministerial nr.127/1991),animalelor,pestilor si altor vietuitoare acvatice.

Intocmit,  
Consilier superior Caltun Florin