

BULETIN DE AVERTIZARE
PRUN

Conditiiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia urmatoarelor boli si daunatori: VIESPEA PRUNELOR(*Hoplocampa minuta* Christ. si *Hoplocampa flava* L.), VIESPEA SEMINTELOR DE PRUN(*Eurytoma schreineri* Schr.), ACARIENI, INSECTE DEFOLIATOARE, AFIDE si boli ca: MONILIOZA(*Monilinia laxa* si *Monilinia fructigena*), DEFORMAREA FRUCTELOR(*Taphrina deformans*), CIURUIREA MICOTICA SI BACTERIANA A FRUNZELOR, PATAREA ROSIE A FRUNZELOR DE PRUN(*Polystigma rubrum* Pers.)

Perioada optima de tratament-**cand 10-15% din flori si-au scuturat petalele.**

SCHEMA ORIENTATIVA DE TRATAMENT

FUNGICIDE:

- SIGNUM-0,05%**(s.a.-boscalid 26,7%+piroclostrobin 6,7%)-poate fi aplicat in perioada infloritului (pentru combaterea moniliozei florilor),fie in perioada maturarii fructelor(pentru combaterea moniliozei fructelor) sau
- VONDOZEB-0,2%**(s.a.-mancozeb 80%) sau
- ROVRAL 500 SC-0,1%**(s.a.-iprocion 500 g/l) sau
- FOLPAN 80 WDG-0,2%**(s.a.-folpet 80%) sau
- BRAVO 500 SC-0,15%**(s.a.-clorotalonil-500g/l)

+

INSECTICIDE:

- KARATE ZEON-0,015%**(s.a.-lambda cihalotrin-50 g/l) sau
- FASTAC 10 CE -0,02%**(s.a.-alfa-cipermetrin 100g/l) sau
- DECIS MEGA 50 EW-0,015%**(s.a.-deltametrin 50 g/l) sau
- IMIDAN 50 WP-0,05%**(s.a.-fosmet-50%) sau
- FASTER 10 EC-0,025%**(s.a.-cipermetrin-100g/l)

Urmatorul tratament se aplica la 8-12 zile pentru combaterea acelorasi boli si daunatori,dar in special pentru VIESPEA SEMINTELOR DE PRUN(*Eurytoma schreineri* Schr.).

Cantitatea de solutie la hectar 1000-1500 litri,iar pentru pomii izolati 3-5 litri/pom in functie de varsta si talia de dezvoltare a pomilor.

Pentru combaterea acarienilor, avand in vedere gradul de atac din anii precedenti,se pot folosi unul din produsele:

- APOLLO 50 SC-0,04%**(s.a.-clofentezin-500 g/l) in 1000 litri apa sau
- NISSORUN 10 WP-0,03%**(s.a.-hexithiazox-10%) in 1000 litri apa sau
- ORTUS 5 SC-0,1%**(s.a.-fenpiroximat 50 g/l) in 1000 litri apa

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim,iar la prepararea solutiei se vor respecta:

- dozele sau concentratiile recomandate in instructiunile de folosire;
- compatibilitatea produselor de protectia plantelor;
- folosirea produselor de protectia plantelor din grupe chimice diferite.

La efectuarea tratamentelor cu produse de protectia plantelor se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii,de protectia mediului,de **PROTECTIE A ALBINELOR**(Conf.Leg.383/2013).

Intocmit,
Ing.Caltun Florin