



Str. Republicii nr. 5
Loc. Focsani Jud. Vrancea
B.A. Nr. 25 Din 28 05. 2016

BULETIN DE AVERTIZARE

Sfecla de zahar , Floarea soarelui , Porumb

Culturile de sfecla , porumb , floarea soarelui sint atacate de gargarita frunzelor de porumb (TANIMECUS DILATICOLIS) , gargarita sfeclei (BOTHYNODERES PUNCTIVENTRES) , gindacul pamintiu (OPATRUM SABULOSUM) .

Daunele mari se produc in perioada rasaririi culturilor .

Atacul se manifesta prin roaderea frunzelor , la un atac puternic cunsuma frunzele in intregime iar cultura poate fi compromisa .

Masurile de combatere a acestora se iau diferentiat :

-daca planta premergatoare a fost sorg, porumb , sfecla sau floarea soarelui un singur an de monocultura iar saminta a fost tratata cu insecticide ,chiar daca densitatea ajunge la 10 exemplare pe m. p. nu se executa tratamente chimice

-in cazul in care saminta nu a fost tratata cu insecticide ,tratamentul se executa obligatoriu in perioada rasaririi plantelor

- in cazul sfeclei de zahar, chiar daca saminta a fost tratata , se executa tratament chimic la rasarirea plantelor .

- daca s-au folosit odata cu semanatul insecticide granulate , nu se executa tratament chimic

Redam mai jos citeva insecticide folosite pentru combaterea acestor daunatori :

- ACTARA 25 WG- 0,01% /ha-la porumb
- MOSPILAN 20 SG -0,01% /ha-la porumb
- CALIPSO 480 SC -0,09 l/ha -tratament de corectie
- IMIDAN 50 WP - 1,5 kg/ha – la floarea soarelui

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE :

Tratamentele fitosanitare se vor executa la momentul optim , cu respectarea dozelor si concentratiilor reconandate .La prepararea amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si respectarea principului alternantei . Se vor respecta cu stictete normele de protectia muncii, de paza si securitate impotriva incendiilor . protectia muncii , de paza si securitate impotriva incendiilor , protectia mediului si protejarea albinelor (L eg 383 / 2013) .

Intocmit,
Ing. Tachiciu Valerica