

M.A.D.R  
D.A.J. VRANCEA  
UNITATEA FITOSANITARA  
Nr.26 din 06.05.2014

„A preveni este mai simplu decat a combate”

## BULETIN DE AVERTIZARE POMICULTURA-MAR,PAR

Condițiile climatice din ultima perioada sunt favorabile aparitiei și dezvoltării următorilor agenți de daunare: FAINARE, RAPAN, PATAREA ALBA, MONILIOZE AFIDE, OMIZI DEFOLIATOARE, OMIZI MINIERE, ACARIENI, PSYLIDE VIERME MAR (generația a-I-a, tratamentul I.).  
Perioada optimă de tratament: **FRUCT CU DIAMETRUL DE 0,5-1,0 cm.**

### VARIANTA -A

#### FUNGICIDE CE COMBAT RAPANUL SI MONILIOZELE

-MERPAN 50 WP-0,2% sau  
-POLYRAM DF-0,25% sau  
-FUNGURAN OH 300 SC-0,044% sau  
-DITHANE M 45-0,2%

#### FUNGICIDE CE COMBAT FAINAREA

-THIOVIT JET 80 WG-0,3% sau  
-KARATHANE M 35 CE-0,06% sau  
-MICROTHIOL SPECIAL-0,3% sau  
-THIOCON 80 PU-0,4%

#### INSECTICIDE

- FASTAC 10 EC-0,02% sau  
- KARATE ZEON-0,015% sau  
- CALYPSO 480 SC-0,02% sau  
- CORAGEN-0,01%

### VARIANTA -B

#### FUNGICIDE SISTEMICE CE COMBAT SIMULTAN RAPANUL, FAINAREA SI MONILIOZA

-TOPSIN 70 WDG-0,07 sau  
-CHORUS 75 WG-0,02% sau  
-STROBY DF-0,01%-0,013% sau  
-FOLICUR SOLO 250 EW-0,05% sau  
-SYSTHANE 12 E-0,04%

#### INSECTICIDELE DE LA VARIANTA -A

Pentru combaterea acarienilor recomandăm următoarelor acaricide: ENVIDOR 240 SC-0,04%, NISSORUN 10 WP-0,03%, MILBEKNOCK EC-0,05%.

Pentru combaterea Puricelui melifer al parului (*Psylla piri L.*) fiind cel mai periculos daunător al parului recomandăm următoarea schemă de tratament:

-DIMILIN 25 WP-0,3% (s.a. -diflubenzuron- 25%) sau  
-ACTARA 25 WP-0,015% (s.a. -tiametoxam-25%) sau  
-MOSPILAN 20 SG-0,02% (s.a. -acetamiprid-20%)

in amestec cu acaricidele:  
-VERTIMEC 1,8% EC-0,1%  
(s.a. -abamectin-18g/l)  
-APOLLO 50 SC-0,04%  
(s.a. -clofentezin-500g/l)

Cantitatea de soluție la hectar-1000-1500 litri.

#### ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, iar la prepararea soluției se vor respecta:  
-dozele sau concentrațiile recomandate,  
-compatibilitatea produselor de protecția plantelor,  
-folosirea produselor de protecția plantelor din grupe chimice diferite.

La efectuarea tratamentelor fitosanitare cu P.P.P., se vor respecta cu strictete normele de protecția muncii, de PROTECTE A ALBINELOR (conf. Ord. Interministerial nr.127/1991), animalelor, pestilor și altor vietuitoare acvatice.

Intocmit- ing.Caltun Florin