

BULETIN DE AVERTIZARE

Conditiiile climatice din ultima perioada sunt favorabile aparitiei si dezvoltarii urmatoarelor boli si daunatori: FAINARE (*Podosphaera leucotricha*), RAPAN (*Venturia inaequalis*-mar si *Venturia pirinapar*), PATAREA ALBA (*Mycosphaerella sentina*), VIESPEA CU FERESTRAU (*Hoplocampa testudinea* Klug.), ACARIENI, AFIDE, INSECTE DEFOLIATOARE, PSYLIDE, etc.

Perioada optima de tratament: **SCUTURAREA PETALELOR.**

Recomandam urmatoarea schema de tratament:

VARIANTA-A

FUNGICIDE CE COMBAT RAPANUL

- DITHANE NEOTEC 75 WP-0,2% sau
- VONDOZEB-0,2% sau
- CAPTAN 50 WP-0,25% sau
- MERPAN 50 WP-0,25% sau
- CHORUS 75 WG-0,02% sau
- BRAVO 500 SC-0,25%

+

FUNGICIDE CE COMBAT FAINAREA

- THIOVIT JET 80 WG-0,3% sau
- KUMULUS DF-0,3% sau
- MICROTHIOL SPECIAL-0,3% sau
- TOPAS 100 EC-0,02%

+

INSECTICIDE

- CALYPSO 480 SC-0,02% sau
- KARARE ZEON-0,015% sau
- ACTARA 25 WG-0,01% sau
- DECIS 25 WG-0,003%

VARIANTA-B

FUNGICIDE SISTEMICE CE COMBAT SIMULTAN RAPANUL SI FAINAREA

- FOLICUR SOLO 250 EW-0,05% sau
- IMPACT 25-0,015% fainare sau
-0,02% rapan
- MACCANI—0,15% sau
- TOPSIN 70 WDG-0,07%

+ INSECTICIDE DE LA VARIANTA-A

Pentru combaterea Puricelui melifer al parului (*Psylla pyri* L.), fiind cel mai periculos daunator al parului, recomandam: **ACTARA 25 WG-0,015%**. Pentru combaterea acarienilor recomandam a se folosi urmatoarelor acaricide: **APOLLO 50 SC-0,04%** sau **NISSORUN 10 WP-0,03%**.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, iar la prepararea solutiei se vor respecta dozele sau concentratiile recomandate in instructiunile de folosire. La efectuarea tratamentelor cu P.P.P. se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii, de protectie a mediului, de **PROTECTIE A ALBINELOR** (Conf. Leg. 383/2013).

Intocmit,
Ing. Caltun Florin