

BULETIN DE AVERTIZARE
Sfecla de zahar , Floarea soarelui, Porumb

Culturile de sfecla de zahar, floarea soarelui,si porumbul sunt atacate de gargarita frunzelor de porumb {Tanimecus dilaticollis},gargarita sfeclei {Bothynoderes punctiventris}, gindacul pamintiu {Opatrum sabulosum}. Daunele cele mai mari se produc in perioada rasaririi culturilor. Atacul se manifesta prin roaderea frunzla la un atac putrnic consuma frunzele in intregime pina la nicelul solului.

La sfecla, si floarea soarelui,distrug frunzele cotiledonale si in cazuri grave ,reteaza plantutele de la nivelul solului. Masurile de combatere a acestor daunatori se iau diferentiat:

-daca planta premergatoare a fost sorg, porumb, sfecla dezahar sau floarea soarelui un singur an de monocultura iar saminta a fost tratata cu insecticide, chiar daca densitatea ajunge la 10 exemplare pe m.p. nu se executa tratamente chimice;

--in cazul in care saminta nu a fost tratata cu insecticide ,tratamentul se face obligatoriu in perioada rasaririi plantelor;

-in cazul sfeclei de zahar , chiar daca saminta a fost tratata ,se executa tratament chimic la rasarirea plantelor;

-daca s-au folosit odata cu semanatul insecticide granulate , nu se executa tratament chimic;

Redam mai jos citeva insecticide folosite pentru combaterea acestor daunatori:

-ACTARA 25 WG -0,1kg/ha sau

-MOSPILAN 20 SG-0,1kg/ha sau

-CALIPSO 480 SC -0,09 l/ha sau

-IMIDAN 50 WP -1,5 kg/ha

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim cu respectarea dozelor si concentratiilor recomandate. In cazul amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si se va respecta principiul alternantei. Se vor respecta cu strictete normele de uz fitosanitar,pe cele de securitatea muncii, de paza si securitatea impotriva incendiilor ,protectia mediului inconjurator ,PROTECTIA ALBINELOR {conf. ORD.Interministerial nr. 127/1991}, animalelor, pestilor si a altor vietuitoare acvatice

Intocmit,
Ing. TACHICIU VALERICA