



Str .Republicii .nr 5
Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

B.A. Nr.29 din 04. 05. 2016

BULETIN DE AVERTIZARE PIERSIC

Ca urmare a conditiilor din ultima perioada cat si,probabil, neefectuarea la timp a tratamentelor fitosanitare,au loc atacuri de mare intensitate produsa de ciuperca Taphrina deformans ce genereaza boala **BASICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC**.Fenomenul este cauzat de conditiile climatice din aceasta primavara:umiditate prelungitata,nopti racoroase si temperaturi cuprinse intre 7-25°C.

Simptomele cele mai caracteristice ale acestei boli apar pe frunze, dar pot fi atacate ramurile si fructele.Frunzele pomilor atacati se ingroasa si se incretesc(se basica),atacul fiind mai evident pe frunzele tinere de la varful lastarilor.Frunzele atacate sunt mai lungi si mai late decat cele sanatoase(ingrosate,de culoare rosie violeta) si cad de timpuriu defoliind pomul,astfel ca dezvoltarea si maturarea ramurilor este tulburata.Fructele din pomii bolnavi se dezvoltă slab si cad inainte de maturare.Lastarii tineri infectati se opresc din crestere,raman scurti,se ingroasa inegal,curbandu-se.

Atacurile anuale repetate asupra frunzisurilor slabesc vigoarea pomului,ducand la uscarea prematura.

COMBATERE:

-**DITHANE M-45-0,2%**(basicarea frunzelor,monilioze,ciuruire) sau

-**BRAVO 500 SC-0,15%**(basicarea frunzelor,monilinia) sau

-**BOUILLE BORDELAISE-0,5%**(basicarea frunzelor,monilioze,ciuruirea frunzelor) sau

-**SCORE 250 EC-0,02%**(basicarea frunzelor,monilioza,ciuruirea frunzelor,fainare) sau

-**TOPSIN 500 SC-0,14%**(basicarea frunzelor)

In cazul cand atacul nu a fost stopat,putand duce la uscarea totala a lastarilor,se recomanda efectuarea rapida a taierilor tuturor organelor atacate,arderea lor si efectuarea unui tratament fitosanitar complexat folosind o combinatie dintre un fungicid sistemic si unul de contact:

-**SCORE 250 EC-0,015%+DITHANE M-45-0,2%**.

Daca atacul este puternic si nu poate stopa avansarea bolii,pomii incepand sa se usuce de la semischelet spre schelet,se recomanda efectuarea unor taieri de recuperare,urmate de lucrari in verde la sfarsitul lunii mai-inceputul lunii iunie,cand cresterile vor fi puternice,efectuarea a 2-3 tratamente fitosanitare ,o fertilizare suplimentare pentru refacerea organelor vegetative.

Pentru evitarea pagubelor produse de aceasta boala periculoasa se recomanda pe langa efectuarea corecta si la timp a tratamentelor fitosanitare si cultivarea de soiuri de piersic rezistente la aceasta boala.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim,iar la prepararea solutiei dozele sau concentratiile recomandate in instructiunile de folosire.La efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii,de protectie a mediului,**ALBINELOR**(Conf. Leg.383/2013).

Intocmit,
Ing. Caltun Florin

