

M.A.D.R.
D.A.J. VRANCEA
UNITATEA FITOSANITARA
Nr.38 din 02.06.2014

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca ”

BULETIN DE AVERTIZARE
POMICULTURA-MAR+PAR

Conditiiile climatice din ultima perioada au favorizat evolutia atacului de rapan (*Venturia inaequalis*). Pentru combaterea acestui agent de daunare se recomanda folosirea urmatoarelor produse de protectia plantelor:

- DITHANE M-45-0,2%(s.a.-mancozeb-80%) sau
- POLYRAM DF-0,25%(s.a.-metiram-80%) sau
- FOLPAN 80 WDG-0,15%(s.a.-folpet-80%) sau
- CAPTAN 80 WDG-0,15%(s.a.-captan-80%)

Pentru combaterea simultana a rapanului, fainarii se pot folosi urmatoarele produse de protectia plantelor:

- FOLICUR SOLO 250 EW-0,025%(s.a.-tebuconazol-250g/l) sau
- CHORUS 75 WG-0,02%(s.a.-ciprodinil-75%) sau
- MACCANI-0,15%(s.a.-piroclostrobin 4%+ditianon 12%)

Pentru combaterea omizilor defoliatoare, omizilor miniere, psylide etc. se recomanda folosirea urmatoarelor insecticide:

- FASTAC-10 EC-0,02% sau
- CALYPSO 480 SC-0,02% sau
- KARATE ZEON-0,015%

Cantitatea de solutie la hectar: 1000-1500 litri

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE

- Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, iar la prepararea solutiei se va respecta:
- dozele sau concentratiile recomandate,
 - compatibilitatea produselor de protectia plantelor,
 - folosirea de produse de protectia plantelor din grupe chimice diferite.

La efectuarea tratamentelor cu P.P.P., se vor respecta cu strictete normele de protectie muncii, de paza si securitate impotriva incendiilor, de protectie a mediului, a albinelor (conf. Leg. 383/2013)

Intocmit,
Ing. Caltun Florin