

BULETIN DE AVERTIZARE  
VITA DE VIE

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea următoarelor boli și dăunători: MANĂ, ANTRACNOZĂ, FĂINARE, PUTREGAI CENUȘIU, PĂDUCELE LÂNOS, MOLIILE STRUGURILOR și ACARIENI.

Perioada optimă de tratament – DUPĂ SCUTURAREA FLORII – tratament de siguranță și obligatoriu - indiferent dacă au fost îndeplinite condițiile optime de dezvoltare.

Recomandăm folosirea fungicidelor sistemice:

Fungicide sistemice ce combat  
mana, antracnoza și rujeola

MELODY DUO 66,8 WP – 2,0 kg/ha sau

- VERITA – 2,0-2,5 kg/ha sau
- ACROBAT MZ 90/600 WP – 2,0 kg/ha sau
- SELENE – 0,250 kg/ha+MANCOZEB-0,8-1,0 kg/ha sau
- ELECTIS 75 WG – 1,5 kg/ha sau
- EQUATION PRO-0,4 kg/ha sau
- MIKAL FLASH – 3,0 kg/ha

Fungicide sistemice ce combat făinarea

TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha sau  
FALCON 460 EC – 0,3 litri/ha sau  
FOLICUR SOLO 250 EW – 0,4 litri/ha sau  
STROBY DF – 0,2 kg/ha sau  
TOPAS 100 EC – 0,250 litri/ha sau  
SYSTHANE FORTE - 0,01%

+

Insecticide ce combat păduchele testos  
moliile și acarienii

MOSPILAN 20 SP – 0,25 kg/ha (păduchele testos + molii) sau  
KARATE ZEON – 0,15 litri/ha (moli) sau  
DECIS MEGA 50 EW – 0,150 litri/ha (moli) sau  
VERTIMEC 1,8% EC-0,8 – 1,0 litri/ha (paianjenul rosu comun, molii, acarienii) sau

Fungicidele sistemice ce combat simultan, mana și făinarea: ECLAIR 49 WG – 0,5 kg/ha sau UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 litri/ha sau SHAVIT F 72 WDG – 2,0 kg/ha.

Pentru combaterea ACARIENILOR (*Eryophies vitis*), când P.E.D.-ul este egal cu 10-25 frunze atacate și ACARIENI TETRANICHIZI când P.E.D.-ul este peste 10-15 exemplare/lăstar, recomandăm următoarele acaricide: OMITE 570 EW-1,0 litri/ha sau VERTIMEC 1,8% EC – 0,8-1,0 litri/ha.

Pentru combaterea Putregaiului cenușiu (*Sclerotinia fuckeliana*), recomandăm următoarele fungicide: TOPSIN AL 70 PU-1,0 – 1,2 kg/ha ( putregai) sau SWITCH 62,5 WG – 0,6 kg/ha (putregai) sau CHORUS 75 WG-0,5 kg/ha (putregai) sau ROVRAL 500 SC – 1,0 litri/ ha (putregai)

Pentru prevenirea și combaterea Putregaiului cenușiu sunt recomandate următoarele tratamente:

- imediat după scuturare;
- compactarea ciorchinilor;
- intrarea în pârgă;
- cu 3-4 săptămâni înainte de recoltare.

Tratamentul se repetă la 10-12 zile.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru PROTECȚIA FAMILIILOR DE ALBINE împotriva intoxicațiilor cu pesticide, veți lua și respecta obligatoriu toate măsurile ce vă revin în acest sens, mai ales în perioada de „înflorire”. Se vor respecta de asemenea măsurile ce privesc și protecția altor agenți polenizatori, a entomofaunei utile, animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

ÎNTOCMIT,  
ING SPINU VIOREL