

„A preveni este mai simplu decât a vindeca”

BULETIN DE AVERTIZARE  
PRUN

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția următoarelor boli și dăunători: PĂDUȘCHELE DIN SAN-JOSE generația –I-a; VIERMELE PRUNELOR generația a II-a; ACARIENI, AFIDE, INSECTE DEFOLIATOARE, MONILIOZE, CIURUIREA MICOTICĂ ȘI BACTERIANĂ, PĂTAREA ROȘIE A FRUNZELOR DE PRUN.

Perioada optimă de tratament – la atingerea PED VIERME PRUN = 1-2 înțepături sau 1 ou la 100 de frunze; la SAN-JOSE - când PED = 2-3 fructe atacate; AFIDE – când PED = 8-10 colonii; ACARIENI – PED = 5 exemplare/frunză.

Schemă orientativă de tratament:

<u>FUNGICIDE</u>	<u>INSECTICIDE</u>	<u>ACARICIDE</u> <u>folosite pentru combaterea</u> <u>acarienilor</u>
- BRAVO 500 SC-0,15%	- IMIDAN 50 WP-0,05%	- NISSORUN 10 WP – 0,03%
- FOLPAN 80 WDG-0,2% +	- CALYPSO 480 SC-0,02%	- APOLLO 50 SC – 0,04%
- CAPTAN 80 WDG-0,15%	- DECIS 25 WG-0,003%	- ORTUS 5 SC – 0,1%
- ODEON 820 WDG-0,08%		
- VONDOZEB – 0,2%		

În cazul în care există atac de ACARIENI (PED = 3-5 acarieni/frunză) , în soluție se va adăuga unul din acaricidele enumerate mai sus.

În cazul unui atac puternic de AFIDE recomandăm unul din următoarele insecticide: CALYPSO 480 SC – 0,02%; ACTARA 25 WG – 0,01%; MAVRIK 2 F – 0,05%;

Următorul tratament se repetă la 10-12 zile.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru PROTECȚIA FAMILIILOR DE ALBINE împotriva intoxicațiilor cu pesticide, veți lua și respecta obligatoriu toate măsurile ce vă revin în acest sens, mai ales în perioada de „înflorire”. Se vor respecta de asemenea măsurile ce privesc și protecția altor agenți polenizatori, a entomofaunei utile, animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

INTOCMIT,  
ING SPINU VIOREL