

„ A preveni este mai simplu decât a vindeca”.

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**POMICULTURĂ – MĂR, PĂR**

Condițiile climatice din ultima perioadă sunt favorabile apariției și dezvoltării bolilor și dăunătorilor: FĂINARE, RAPĂN, MONILIOZĂ, PĂTAREA ALBĂ ȘI BRUNĂ, PĂDUCELE DIN SAN-JOSE , VIERMELE MERELOR, PĂDUCELE LÂNOS AL MĂRULUI , AFIDE, OMIZI DEFOLIATOARE, OMIZI MINIERE, ACARIENI și PSYLLIDE.

Perioada optimă de tratament: La atingerea P.E.D.-ului: VIERME MĂR (când PED = 1-2 înțepături sau un ou la 100 frunze); la SAN-JOSE (când PED = 2-3 fructe atacate); AFIDE (când PED = 8-10 colonii); ACARIENI (PED = 5 exemplare /frunză); OMIZI MINIERE ( PED = 1-2 mine / frunză).

**FUNGICIDE SISTEMICE CE COMBAT SIMULTAN**

**RAPĂNUL, FĂINAREA ȘI MONILIOZA**

- STROBY DF – 0,01%-0,013% sau
- SYSTHANE 12 E – 0,04% sau
- ORIUS 25 EW – 0,05% sau
- TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau
- FOLICUR SOLO 250 EW – 0,05% sau
  
- VECTRA 10 SC – 0,03% sau
- CHORUS 75 WG 0,02%

**INSECTICIDE**

- DANTOP 50 WG – 0,02% (Păducele din San-Jose, păducele lănos, miniere și vierme) sau
- CALYPSO 480 SC- 0,02% (San-Jose, vierme măr, miniere, afide)
- DECIS 25 WG- 0,003% (San –Jose, vieme măr, minatoare, afide) sau
- DECIS MEGA 50 EW – 0,015 ( San-Jose, afide, vierme măr, molia pielitei) sau
- KARATE ZEON – 0,015% -(Vierme măr, afide) sau
- LASER 240 SC – 0,06% (San-Jose, minierul marmorat, vierm măr) sau
- ACTARA 25 WG – 0,01% (Păducele din San-Jose, minatoare, păducele lănos și afide).

- Pentru combaterea Păducelui lănos, recomandăm: MAVRIK 2F – 0,05%; MOSPILAN 20 SP – 0,025%; NURELLE D 50/500 EC – 0,08%; ACTARA 25 WG – 0,01%; DECIS 2,5 EC – 0,05%.

Pentru combaterea acarienilor recomandăm a se folosi următoarele acaricide: DEMITAN 200 SC – 0,05% ; OMITE 570 EW – 0,1%; NISSORUN 10 WP – 0,03%; ENVIDOR 240 SC – 0,04%.

Pentru combaterea Puricelui melifer al părului (Psylla piri) fiind cel mai periculos dăunător al părului recomandăm următoarea schemă de tratament:

- NOMOLT 15 SC – 0,05%;
  - DIMILIN 25 WP – 0,03%;
  - RIMON 10 EC – 0,075%.
- + în amestec cu acaricidele: VERTIMEC 1,8% EC – 0,1% - 0,15%

care au efect sinergic și măresc eficacitatea de combatere.

Tratamentul se repetă la 10-12 zile.

**ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:** Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru PROTECȚIA FAMILIILOR DE ALBINE împotriva intoxicațiilor cu pesticide, veți lua și respecta obligatoriu toate măsurile ce vă revin în acest sens, mai ales în perioada de „înflorire” . Se vor respecta de asemenea măsurile ce privesc și protecția altor agenți polenizatori, a entomofaunei utile, animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

INTOCMIT,  
ING. SPINU VIOREL