

„ A preveni este mai simplu decât a vindeca”.

BULETIN DE AVERTIZARE
LEGUMICULTURĂ

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea unor boli:

- Pătarea albă a frunzelor, pătarea brună, pătarea cafenie a frunzelor, antracnoza, alternarioza, ofilirea bacteriană, pătarea frunzelor și bășicarea fructelor de tomate, fuzarioză și verticilioză la TOMATE, ARDEI, VINETE.

- Pătarea unghiulară, mana și făinarea - CASTRAVEȚI

Fungicide de contact:

- ALCUPRAL 50 PU – 0,5% sau
- DITHANE M 45 – 0,2% sau
- BRAVO 500 SC – 0,15% – 0,2%

Fungicide sistemice

- EQUATION PRO – 0,04% sau
- FOLIO GOLD 537,5 SC – 0,2%

La castraveți pentru combaterea făinării în soluție se va adăuga și un fungicid ce combate făinarea: SYSTHANE FORTE – 0,02% sau KUMULUS DF – 0,4%.

În cazul când sunt precipitații abundente de peste 18 – 20 mm, temperaturi ridicate, umiditate atmosferică > 90%, prezența picăturilor de apă ce persistă pe frunze cel puțin 10-12 ore, recomandăm efectuarea tratamentelor folosind FUNGICIDE SISTEMICE.

Pentru combaterea dăunătorilor cum ar fi: MUSCULIȚA ALBĂ DE SERĂ, PĂDUCHELE CASTRAVEȚILOR, PĂIANJENUL ROȘU, PĂIANJENUL LAT, PĂDUCHELE SOLANACEELOR, PĂDUCHELE VERDE, OMIDA CAPSULELOR, MUSCA MINIERĂ, în soluția de stropit se adaugă și un insecticid cum ar fi:

- ACTARA 25 WG – 0,02% sau
- MAVRIK 2 F – 0,05% sau
- MOSPILAN 20 SP – 0,025%

Pentru combaterea acarienilor recomandăm: APOLLO 50 SC – 0,04%; NISSORUN 10 WP – 0,04%; ORTUS 5 SC – 0,1%;

Pentru combaterea fuzariozei și a verticiliozei, recomandăm a se efectua un tratament la sol, în jurul coletului, folosind 0,5 litri soluție pentru fiecare plantă în parte, cu unul din fungicidele: TOPSIN AL 70 PU – 0,05-0,1% sau TOPSIN 500 SC – 0,07% - 0,14%

Următorul tratament se repetă la 10-12 zile.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru PROTECȚIA FAMILIILOR DE ALBINE împotriva intoxicațiilor cu pesticide, veți lua și respecta obligatoriu toate măsurile ce vă revin în acest sens, mai ales în perioada de „înflorire” . Se vor respecta de asemenea măsurile ce privesc și protecția altor agenți polenizatori, a entomofaunei utile, animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

ÎNTOCMIT,
ING SPINU VIOREL